

| CLASSE AMPHIBIA | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME POPULAR |
| ANURA | Bufonidae | <i>Rhinella ornata</i> | Sapo-curuzinho |
| | | <i>Rhinella schneideri</i> | Sapo-cururu-grande |
| | Hylidae | <i>Dendropsophus minutus</i> | Pererequinha-do-brejo |
| | | <i>Dendropsophus nanus</i> | Pererequinha-do-brejo |
| | | <i>Dendropsophus sanborni</i> | Pererequinha-do-brejo |
| | | <i>Hypsiboas albopunctatus</i> | Perereca-cabrinha |
| | | <i>Scinax fuscomarginatus</i> | Pererequinha-do-brejo |
| | | <i>Scinax fuscovarius</i> | Perereca-de-banheiro |
| | Leptodactylidae | <i>Leptodactylus fuscus</i> | Rã-assobiadora |
| | | <i>Leptodactylus labyrinthicus</i> | Rã-pimenta |
| | | <i>Leptodactylus mystacinus</i> | Rã-marrom |
| | | <i>Leptodactylus notoakitites</i> | Rã-marrom |
| | Leiuperidae | <i>Physalaemus cuvieri</i> | Rã-cachorro |
| | Cycloramphidae | <i>Proceratophrys boiei</i> | Sapo-de-chifre |
| | Craugastoridae | <i>Haddadus binotatus</i> | Rã-do-folhicho |
| | Microhylidae | <i>Elachistocleis ovalis</i> | "Sapo-guarda" |

| CLASSE REPTILIA | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME POPULAR |
| SQUAMATA | Amphisbaenidae | <i>Amphisbaena alba</i> | "Cobra-de-duas-cabeças" |
| | | <i>Cercolophia roberti</i> | "Cobra-de-duas-cabeças" |
| | Scincidae | <i>Mabuya dorsivittata</i> | Calango-liso |
| | | <i>Mabuya frenata</i> | Calango-liso |
| | Gymnophthalmidae | <i>Cercosaura ocellata</i> | N.C.N |
| | Anguidae | <i>Ophiodes striatus</i> | "Cobra-de-vidro" |
| | Tropiduridae | <i>Tropidurus itambere</i> | Calango |
| | Teiidae | <i>Ameiva ameiva</i> | Calango-verde |
| | | <i>Tupinambis merianae</i> | Teiú |
| | Gekkonidae | <i>Hemidactylus mabouia</i> | Lagartixa-de-parede |
| | Leiosauridae | <i>Enyalius iheringii</i> | Lagarto-verde-da-árvore |
| | | <i>Urostrophus vautieri</i> | Lagarto-da-pedra |
| | Anomalepididae | <i>Lyothlyphlops beiu</i> | Cobra-cabelo |
| | Elapidae | <i>Micrurus corallinus</i> | Coral-verdadeira |
| | Viperidae | <i>Bothrops jararaca</i> | Jararaca |
| | Boidae | <i>Boa constrictor</i> | Jibóia |
| | Colubridae | <i>Apostolepis dimidiata</i> | Cobra-da-terra |
| | | <i>Chironius bicarinatus</i> | Cobra-cipó |
| | | <i>Chironius quadricarinatus</i> | Cobra-cipó |
| | | <i>Dipsas indica</i> | Dormideira |
| | | <i>Elapomorphus mertensi</i> | Falsa-coral |
| | | <i>Erythrolamprus aesculapii</i> | Falsa-coral |
| | | <i>Helicops modestus</i> | Cobra-d'água |
| | | <i>Liophis miliaris</i> | Cobra-d'água |
| | | <i>Liophis poecilogurur</i> | Cobra-do-capim |
| | | <i>Liophis reginae</i> | Jararaquinha-do-campo |
| | | <i>Mastigodryas bifossatus</i> | Jararacuçu-do-brejo |
| | | <i>Oxyrhopus guibei</i> | Falsa-coral |
| | | <i>Philodryas olfersii</i> | Cobra-verde |
| | | <i>Philodryas patagoniensis</i> | Cobra-cipó |
| | | <i>Sibynomorphus mikanii</i> | Dormideira |
| | | <i>Simophis rhinostoma</i> | Falsa-coral |
| | | <i>Spilotes pullatus</i> | Caninana |
| | | <i>Tantilla melanocephala</i> | Cobra-da-terra |
| | | <i>Thamnodynastes strigatus</i> | Corredeira |
| TESTUDINES | Chelidae | <i>Hydromedusa tectifera</i> | Cágado-pescoço-de-cobra |

| CLASSE AVES | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME POPULAR |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | <i>Crypturellus obsoletus</i> | Inhambu-guaçu |
| | | <i>Crypturellus parvirostris</i> | Inhambu-chororó |
| | | <i>Crypturellus tataupa</i> | Inambu-xintã |
| | | <i>Nothura maculosa</i> | Codorna-comum |
| ANSERIFORMES | Anatidae | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Marreca-ananaí |
| | | <i>Dendrocygna viduata</i> | Irerê |
| GALLIFORMES | Cracidae | <i>Penelope superciliaris</i> | Jacupemba |
| APODIFORMES | Apodidae | <i>Chaetura andrei</i> | Andorinhão-do-temporal |
| | | <i>Cypseloides fumigatus</i> | Taperuçu-preto |
| | | <i>Streptoprocne zonaris</i> | Andorinhão-de-coleira |
| | Trochilidae | <i>Amazilia lactea</i> | Beija-flor-de-peito-safira |
| | | <i>Amazilia versicolor</i> | Beija-flor-de-banda-branca |
| | | <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Beija-flor-de-veste-preto |
| | | <i>Chlorostilbon lucidus</i> | Besourinho-de-bico-vermelho |
| | | <i>Colibri serrirostris</i> | Beija-flor-de-canto |
| | | <i>Eupetomena macroura</i> | Beija-flor-tesoura |
| | | <i>Leucochloris albicollis</i> | Beija-flor-de-papo-branco |
| | | <i>Florisuga fusca</i> | Beija-flor-preto-de-rabo-branco |
| | | <i>Phaethornis pretrei</i> | Rabo-branco |
| | | <i>Thalurania glaucopis</i> | Beija-flor-de-fronte-violeta |
| | | <i>Malacoptila striata</i> | João-barbudo |
| | | <i>Nystalus chacuru</i> | João-bobo |
| PICIFORMES | Picidae | <i>Veniliornis spilogaster</i> | Pica-pauzinho-verde-carjô |
| | | <i>Campephilus melanoleucus</i> | Pica-pau-de-topete-vermelho |
| | | <i>Celeus flavescens</i> | João-velho |
| | | <i>Colaptes melanochloros</i> | Pica-pau-verde-barrado |
| | | <i>Colaptes campestris</i> | Pica-pau-do-campo |
| | | <i>Dryocopus lineatus</i> | Pica-pau-de-banda-branca |
| | | <i>Melanerpes candidus</i> | Pica-pau-branco |
| | | <i>Picumnus cirratus</i> | Picapauzinho |
| | Ramphastidae | <i>Ramphastos toco</i> | Tucano-toco |
| PSITTACIFORMES | Psittacidae | <i>Amazona aestiva</i> | Papagaio-verdadeiro |
| | | <i>Aratinga leucophthalma</i> | Periquitão-maranã |
| | | <i>Forpus xanthopterygius</i> | Tuim |
| | | <i>Pionus maximiliani</i> | Maitaca |
| STRIGIFORMES | Strigidae | <i>Glaucidium brasilianum</i> | Caburé |
| | | <i>Megascops atricapilla</i> | Corujinha-sapo |
| | | <i>Athene cunicularia</i> | Coruja-buraqueira |
| | | <i>Megascops choliba</i> | Corujinha-do-mato |
| | | <i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> | Murucututu-pequena |
| | | <i>Rhinoptynx clamator</i> | Coruja-orelhuda |
| | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Suindara |
| CAPRIMULGIFORMES | Caprimulgidae | <i>Caprimulgus parvulus</i> | Bacurau-pequeno |
| | | <i>Chordeiles sp</i> | Bacurau |
| | | <i>Hydropsalis torquata</i> | Bacurau-tesoura |
| | | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Tuju |
| | | <i>Nyctidromus albicollis</i> | Curiango |
| CHARADRIIFORMES | Charadriidae | <i>Vanellus chilensis</i> | Quero-quero |
| | | <i>Himantopus melanurus</i> | Pernilongo-das-costas-brancas |
| | Scolapidae | <i>Tringa solitaria</i> | Maçarico-solitário |
| | Jacaniidae | <i>Jacana jacana</i> | Jaçanã |
| CICONIIFORMES | Ardeidae | <i>Bubulcus ibis</i> | Garça-boiadeira |
| | | <i>Butorides striata</i> | Socozinho |
| | | <i>Syrigma sibilatrix</i> | Maria-faceira |
| | Threskiornithidae | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Corocoró |
| | | <i>Patagioenas cayennensis</i> | Pomba-galega |
| COLUMBIFORMES | Columbidae | <i>Patagioenas picazuro</i> | Asa-branca |
| | | <i>Columbina squammata</i> | Fogo-apagou |
| | | <i>Columbina minuta</i> | Rolinha-de-asa-canela |
| | | <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha |
| | | <i>Geotrygon violacea</i> | Juriti-vermelha |
| | | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Juriti-gemeadeira |
| | | <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti-pupu |
| | | <i>Zenaida auriculata</i> | Pomba-de-bando |
| | | <i>Megasceryle torquata</i> | Martim-pescador-grande |
| CORACIIFORMES | Alcedinidae | <i>Chloroceryle americana</i> | Martim-pescador-pequeno |

| CLASSE AVES | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME POPULAR |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | <i>Crypturellus obsoletus</i> | Inhambu-guaçu |
| | | <i>Crypturellus parvirostris</i> | Inhambu-chororó |
| | | <i>Crypturellus tataupa</i> | Inambu-xintã |
| | | <i>Nothura maculosa</i> | Codorna-comum |
| ANSERIFORMES | Anatidae | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Marrecá-ananai |
| | | <i>Dendrocygna viduata</i> | Irerê |
| GALLIFORMES | Cracidae | <i>Penelope supercilialis</i> | Jacupemba |
| APODIFORMES | Apodidae | <i>Chaetura andrei</i> | Andorinhão-do-temporal |
| | | <i>Cypseloides fumigatus</i> | Taperugu-preto |
| | | <i>Streptoprocne zonaris</i> | Andorinhão-de-coleira |
| | Trochilidae | <i>Amazilia lactea</i> | Beija-flor-de-peito-safira |
| | | <i>Amazilia versicolor</i> | Beija-flor-de-banda-branca |
| | | <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Beija-flor-de-veste-preto |
| | | <i>Chlorostilbon lucidus</i> | Besourinho-de-bico-vermelho |
| | | <i>Colibri serrirostris</i> | Beija-flor-de-canto |
| | | <i>Eupetomena macroura</i> | Beija-flor-tesoura |
| | | <i>Leucochloris albigollis</i> | Beija-flor-de-papo-branco |
| | | <i>Florisuga fusca</i> | Beija-flor-preto-de-rabo-branco |
| | | <i>Phaethornis pretrei</i> | Rabo-branco |
| | | <i>Thalurania glaucopis</i> | Beija-flor-de-fronte-violeta |
| | Bucconidae | <i>Malacoptila striata</i> | João-barbudo |
| | | <i>Nystalus chacuru</i> | João-bobo |
| PICIFORMES | Picidae | <i>Veniliornis spilogaster</i> | Pica-pauzinho-verde-carijó |
| | | <i>Campephilus melanoleucus</i> | Pica-pau-de-topete-vermelho |
| | | <i>Celeus flavescens</i> | João-velho |
| | | <i>Colaptes melanochloros</i> | Pica-pau-verde-barrado |
| | | <i>Colaptes campestris</i> | Pica-pau-do-campo |
| | | <i>Dryocopus lineatus</i> | Pica-pau-de-banda-branca |
| | | <i>Melanerpes candidus</i> | Pica-pau-branco |
| | | <i>Picumnus cirratus</i> | Picapauzinho |
| | Ramphastidae | <i>Ramphastos toco</i> | Tucano-toco |
| PSITTACIFORMES | Psittacidae | <i>Amazona aestiva</i> | Papagaio-verdadeiro |
| | | <i>Aratinga leucophthalma</i> | Periquito-maracanã |
| | | <i>Forpus xanthopterygius</i> | Tuim |
| | | <i>Pionus maximiliani</i> | Maitaca |
| STRIGIFORMES | Strigidae | <i>Glaucidium brasilianum</i> | Caburé |
| | | <i>Megascops atricapilla</i> | Corujinha-sapo |
| | | <i>Athene cunicularia</i> | Coruja-buraqueira |
| | | <i>Megascops choliba</i> | Corujinha-do-mato |
| | | <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> | Murucutu-pequena |
| | | <i>Rhinoptynx clamator</i> | Coruja-orelhuda |
| | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Suindara |
| CAPRIMULGIFORMES | Caprimulgidae | <i>Caprimulgus parvulus</i> | Bacurau-pequeno |
| | | <i>Chordeiles sp</i> | Bacurau |
| | | <i>Hydropsalis torquata</i> | Bacurau-tesoura |
| | | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Tuju |
| | | <i>Nyctidromus albigollis</i> | Curiano |
| CHARADRIIFORMES | Charadriidae | <i>Vanellus chilensis</i> | Quero-quero |
| | | <i>Himantopus melanurus</i> | Permilongo-das-costas-brancas |
| | Scolapidae | <i>Tringa solitaria</i> | Maçarico-solitário |
| CICONIIFORMES | Jacanidae | <i>Jacana jacana</i> | Jacaná |
| | | <i>Bubulcus ibis</i> | Garça-boiadeira |
| | | <i>Butorides striata</i> | Socozinho |
| | Ardeidae | <i>Syrigma sibilatrix</i> | Maria-faceira |
| | | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Corocoró |
| COLUMBIFORMES | Columbidae | <i>Patagioenas cayennensis</i> | Pomba-galega |
| | | <i>Patagioenas picazuro</i> | Asa-branca |
| | | <i>Columbina squammata</i> | Fogo-apagou |
| | | <i>Columbina minuta</i> | Rolinha-de-asa-canela |
| | | <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha |
| | | <i>Geotrygon violacea</i> | Juriti-vermelha |
| | | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Juriti-gemeadeira |
| | | <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti-pupu |
| | | <i>Zenaida auriculata</i> | Pomba-de-bando |
| | | <i>Megasceryle torquata</i> | Martim-pescador-grande |
| CORACIIFORMES | Alcedinidae | <i>Chloroceryle americana</i> | Martim-pescador-pequeno |
| | | <i>Coccyzus euleri</i> | Papa-lagarta-de-euler |
| CUCULIFORMES | Cuculidae | <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Papa-lagarta |
| | | <i>Crotophaga ani</i> | Anu-preto |
| | | <i>Guiraca guiraca</i> | Anu-branco |
| | | <i>Piaya cayana</i> | Alma-de-gato |
| | | <i>Tapera naevia</i> | Saci |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| FALCONIFORMES | Accipitridae | <i>Buteo brachyurus</i> | Gavião-de-rabo-curto |
| | | <i>Rupornis magnirostris</i> | Gavião-carijó |
| | | <i>Elanus leucurus</i> | Gavião-peneira |
| | | <i>Harpagus diodon</i> | Gavião-bombachinha |
| | | <i>Buteogallus meridionalis</i> | Gavião-caboclo |
| | | <i>Buteo albicaudatus</i> | Gavião-de-rabo-branco |
| | | <i>Leptodon cayanensis</i> | Gavião-de-cabeça-cinza |
| | Cathartidae | <i>Ictinia plumbea</i> | Sovi |
| | | <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-de-cabeça-preta |
| | Falconidae | <i>Falco femoralis</i> | Falcão-de-coleira |
| | | <i>Falco sparverius</i> | Quiriquiri |
| | | <i>Milvago chimachima</i> | Carrapateiro |
| | | <i>Caracara plancus</i> | Caracará |
| PELECANIFORME | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá |
| GRUIFORMES | Rallidae | <i>Aramides cajanea</i> | Três-potes |
| | | <i>Gallinula chloropus</i> | Frango d'água |
| | | <i>Porzana albicollis</i> | Sanã-carijó |
| | | <i>Rallus nigricans</i> | Saracura-sanã |
| | Cariamidae | <i>Cariama cristata</i> | Seriema |
| | Coerebidae | <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica |
| | Corvidae | <i>Cyanocorax cristatellus</i> | Gralha-do-campo |
| | Tityridae | <i>Pachyrhamphus polychropterus</i> | Caneleirinho-preto |
| | | <i>Tityra cayana</i> | Anambé-branco-de-rabo-preto |
| | | <i>Schiffornis virescens</i> | Flautim |
| | Dendrocolaptidae | <i>Campylorhamphus falcularius</i> | Arapaçu-de-bico-torto |
| | | <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | Arapaçu-grande |
| | | <i>Xiphorhynchus fuscus</i> | Arapaçu-rajado |
| | | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Arapaçu-verde |
| | Estrildidae | <i>Estrilda astrild</i> | Bico-de-lacre |
| | Conopophagidae | <i>Donacobius atricapillus</i> | Gaturamo-do-brejo |
| | | <i>Conopophaga lineata</i> | Chupa-dente |
| | Thamnophilidae | <i>Batara cinerea</i> | Matracão |
| | | <i>Drymophila ochropyga</i> | Choquinha-de-dorso-vermelho |
| | | <i>Drymophila ferruginea</i> | Trovoada |
| | | <i>Dysithamnus mentalis</i> | Choquinha-lisa |
| | | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | Chorrozinho-de-asa-vermelha |
| | | <i>Hypoedaleus guttatus</i> | Chocão-carijó |
| | | <i>Mackenziaena severa</i> | Borralhara |
| | | <i>Thamnophilus caeruleus</i> | Choca-da-mata |
| | | <i>Thamnophilus doliatus</i> | Choca-barrada |
| | Cardinalidae | <i>Cyanococcyx cyaneus</i> | Azulão |
| | Emberizidae | <i>Saltator similis</i> | Trinca-ferro-verdadeiro |
| | | <i>Coryphospingus cucullatus</i> | Tico-tico-rei |
| | | <i>Haplospiza unicolor</i> | Cigarra-bambu |
| | | <i>Sporophila caeruleus</i> | Coleirinho |
| | | <i>Tiaris fuliginosus</i> | Cigarra-do-coqueiro |
| | | <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu |
| | Furnariidae | <i>Zonotrichia capensis</i> | Tico-tico |
| | | <i>Automolus leucophthalmus</i> | Barranqueiro-de-olho-branco |
| | | <i>Cranioleuca pallida</i> | Arredio-pálido |
| | | <i>Furnarius rufus</i> | João-de-barro |
| | | <i>Lochmias nematura</i> | João-porca |
| | | <i>Synallaxis frontalis</i> | Petrim |
| | | <i>Synallaxis ruficapilla</i> | Pichororé |
| | | <i>Synallaxis spixi</i> | João-teneném |
| | | <i>Xenops rutilans</i> | Bico-virado-carijó |
| | Hirundinidae | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | Andorinha-pequena-de-casa |
| | | <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande |
| | | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Andorinha-serrador |
| | | <i>Tachycineta leucorrhoa</i> | Andorinha-de-sobre-branca |
| | Icteridae | <i>Molothrus bonariensis</i> | Chupim |
| | | <i>Pseudoleites guirahuro</i> | Chupim-do-brejo |
| | | <i>Chrysomus ruficapillus</i> | Garibaldi |
| | | <i>Icterus cayanensis</i> | Inhapim |
| | Mimidae | <i>Mimus saturninus</i> | Sabiá |
| | Parulidae | <i>Basileuterus culicivorus</i> | Pula-pula |
| | | <i>Basileuterus flaveolus</i> | Canário-do-mato |
| | | <i>Basileuterus hypoleucus</i> | Pichito |
| | | <i>Basileuterus leucoblepharus</i> | Pula-pula-assoviador |
| | | <i>Dendroica striata</i> | Blackpoll warbler |
| | | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Pia-cobra |
| | | <i>Parula pitiayumi</i> | Mariquita |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| PASSERIFORMES | Pipridae | <i>Antilophia galeata</i> | Soldadinho |
| | | <i>Chiroxiphia caudata</i> | Tangará-dançador |
| | | <i>Manacus manacus</i> | Rendeira |
| | Passeridae | <i>Passer domesticus</i> | Pardal |
| | Rhinocryptidae | <i>Psilorhamphus guttatus</i> | Tapaculo-pintado |
| | | <i>Conirostrum speciosum</i> | Figuinha-de-rabo-castanho |
| | Thraupidae | <i>Habia rubica</i> | Tié-de-mato-grosso |
| | | <i>Dacnis cayana</i> | Sai-azul |
| | | <i>Hemithraupis ruficapilla</i> | Saíra-da-mata |
| | | <i>Nemosia pileata</i> | Saíra-de-chapéu-preto |
| | | <i>Pipraeidea melanonota</i> | Viúva |
| | | <i>Pyrrhocomma ruficeps</i> | Cabecinha-castanha |
| | | <i>Ramphocelus carbo</i> | Pipira-vermelho |
| | | <i>Tachyphonus coronatus</i> | Tié-preto |
| | | <i>Tangara cayana</i> | Saíra-amarelo |
| | | <i>Tersina viridis</i> | Saiandorinha |
| | | <i>Thlypopsis sordida</i> | Canário-sapé |
| | | <i>Thlypopsis sayaca</i> | Sanhaço-cinza |
| | | <i>Trichothraupis melanops</i> | Tié-de-topete |
| | Fringillidae | <i>Euphonia chlorotica</i> | Vi-vi |
| | | <i>Euphonia violacea</i> | Gaturamo-verdadeiro |
| | Troglodytidae | <i>Troglodytes musculus</i> | Coruira |
| | Turdidae | <i>Turdus flavipes</i> | Sabiá-una |
| | | <i>Turdus albicollis</i> | Sabiá-coleira |
| | | <i>Turdus amaurochalinus</i> | Sabiá-poca |
| | | <i>Turdus leucomelas</i> | Sabiá-barranco |
| | | <i>Turdus nigriceps</i> | Sabiá-ferreiro |
| | Tyrannidae | <i>Turdus rufigularis</i> | Sabiá-laranjeira |
| | | <i>Camptostoma obsoletum</i> | Risadinha |
| | | <i>Capsiempis flaveola</i> | Marianinha-amarela |
| | | <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | Guaracavuçu |
| | | <i>Colonia colonus</i> | Viuvinha |
| | | <i>Cranioleuca pallida</i> | Arredio-pálido |
| | | <i>Elaenia flavogaster</i> | Guaracava-de-barriga-amarela |
| | | <i>Elaenia sp.</i> | Guaracava |
| | | <i>Contopus cinereus</i> | Papa-mosca-cinza |
| | | <i>Lathrotriccus euleri</i> | Enferrujado |
| | | <i>Empidonax varius</i> | Peitica |
| | | <i>Gubernates yetapa</i> | Tesoura-do-brejo |
| | | <i>Procnias nudicollis</i> | Araponga |
| | | <i>Hemitriccus nidipendulus</i> | Tachuri-campinha |
| | | <i>Hemitriccus orbitatus</i> | Tiririzinho-da-mata |
| | | <i>Knipolegus cyanirostris</i> | Maria-preta-de-bico-azulado |
| | | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | Cabeçudo |
| | | <i>Machetornis rixosa</i> | Bem-te-vi-do-gado |
| | | <i>Megarhynchus pitangua</i> | Bem-te-vi-de-bico-chato |
| | | <i>Myiarchus ferox</i> | Maria-cavaleira |
| | | <i>Myiarchus swainsoni</i> | Irrê |
| | | <i>Myiodynastes maculatus</i> | Bem-te-vi-rajado |
| | | <i>Myiopagis caniceps</i> | Guaracava |
| | | <i>Myiopagis viridicatus</i> | Guaracava-de-olheiras |
| | | <i>Myiophobus fasciatus</i> | Filipe |
| | | <i>Myiozetetes similis</i> | Bem-te-vizinho-penacho-vermelho |
| | | <i>Mionectes rufiventris</i> | Supi-de-cabeça-cinza |
| | | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bem-te-vi |
| | | <i>Platyrinchus mystaceus</i> | Patinho |
| | | <i>Satrapa icterophrys</i> | Suiriri-pequeno |
| | | <i>Serpophaga subcristata</i> | Alegrinho |
| | | <i>Sirystes sibilator</i> | Gritador |
| | | <i>Todirostrum cinereum</i> | Reloginho |
| | | <i>Tolmomyias sulphureus</i> | Bico-chato-de-orelha-preta |
| | | <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri |
| | | <i>Tyrannus savana</i> | Tesoura |
| | Vireonidae | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Gente-de-fora-vem |
| | | <i>Hylophilus poicilotis</i> | Verdinho-coroado |
| | | <i>Vireo olivaceus</i> | Juruviara |

| CLASSE MAMMALIA | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME POPULAR |
| DIDELPHIMORPHIA | Didelphidae | <i>Caluromys philander</i> | Cuíca |
| | | <i>Caluromys lanatus</i> | Gambá |
| | | <i>Didelphis albiventris</i> | Gambá-de-orelha-branca |
| | | <i>Didelphis marsupialis</i> | Gambá |
| | | <i>Didelphis aurita</i> | Gambá-de orelha-preta |
| | | <i>Marmosa sp.</i> | Cuíca |
| CHIROPTERA | Molossidae | <i>Molossus molossus</i> | Morcego-rabo-de-rato |
| | Molossidae | <i>Tadarida brasiliensis</i> | Morcego |
| | Phyllostomidae | <i>Artibeus lituratus</i> | Morcego-da-fruta |
| | | <i>Carollia perspicillata</i> | Morcego-da-fruta |
| | | <i>Glossophaga soricina</i> | Morcego-beija-flor |
| | | <i>Micronycteris megalotis</i> | Morcego |
| | | <i>Phyllostomus hastatus</i> | Morcego |
| | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> | Morcego-da-fruta |
| | | <i>Sturnira lillium</i> | Morcego-da-fruta |
| | | <i>Desmodus rotundus</i> | Morcego-vampiro |
| | | <i>Anoura caudifera</i> | Morcego-beija-flor |
| | | <i>Pygoderma bilabiatum</i> | Morcego |
| | | <i>Uroderma bilobatum</i> | Morcego |
| | | <i>Chiroderma doriae</i> | Morcego |
| | | <i>Phyllostomus discolor</i> | Morcego |
| | | <i>Vampyressa pusilla</i> | Morcego-da-fruta |
| | Vespertilionidae | <i>Eptesicus furinallis</i> | Morcego |
| | | <i>Lasiurus cinereus</i> | Morcego |
| | | <i>Myotis nigricans</i> | Morcego-borboleta |
| PRIMATA | Atelidae | <i>Alouatta clamitans</i> | Bugio |
| | Cebidae | <i>Callithrix penicillata</i> | Sagui-de-tufo-preto |
| | | <i>Cebus nigrilus</i> | Macaco-prego |
| XENARTHRA | Dasypodidae | <i>Dasypus novemcinctus</i> | Tatu-galinha |
| | | <i>Euphractus sexcinctus</i> | Tatu-peludo |
| CARNIVORA | Canidae | <i>Cerdocyon thous</i> | Cachorro-do-mato |
| | Procyonidae | <i>Procyon cancrivorus</i> | Mão-pelada |
| | Mustelidae | <i>Galictis cuja</i> | Furão |
| | | <i>Lontra longicaudis</i> | Lontra |
| | Felidae | <i>Puma concolor</i> | Onça-parda |
| | | <i>Puma yaguaroundi</i> | Gato-mourisco |
| | | <i>Leopardus tigrinus</i> | Gato-do-mato |
| | | <i>Leopardus tigrinus</i> | Gato-do-mato |
| LAGOMORPHA | Leporidae | <i>Lepus europeus</i> | Lebre |
| | | <i>Silvilagus brasiliensis</i> | Tapiti |
| RODENTIA | Caviidae | <i>Cavia aperea</i> | Preá |
| | | <i>Hydrochoeris hydrochaeris</i> | Capivara |
| | | <i>Cuniculus paca</i> | Paca |
| | Cricetidae | <i>Calomys laucha</i> | Rato-do-mato |
| | | <i>Necomys lasiurus</i> | Rato-do-mato |
| | | <i>Oligoryzomys nigripes</i> | Rato-do-mato |
| | | <i>Akodon cursor</i> | Rato |
| | Erethizontidae | <i>Sphiggurus villosus</i> | Ouriço-cacheiro |
| | Muridae | <i>Mus musculus</i> | Camundongo |
| | Myocastoridae | <i>Myocastor coypus</i> | Ratão-do-banhado |
| | Sciuridae | <i>Guerlinguetus ingrami</i> | Serelepe, esquilo |
| ARTIODACTYLA | Cervidae | <i>Mazama americana</i> | Veado-mateiro |
| | Cervidae | <i>Mazama gouazoubira</i> | Veado-ará |

| ORDEM | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADES |
| ORDEM ANURA | | | |
| BRACHYCEPHALIDAE | Brachycephalus | <i>ephippium</i> | - |
| | Eleutherodactylus | <i>binotatus</i> | - |
| | E. | <i>juipoca</i> | - |
| BUFONIDAE | <i>Chaunus</i> | <i>ornatus</i> | - |
| | C. | <i>ictericus</i> | ? |
| | C. | <i>schneideri</i> | 3/55 |
| | C. | sp. | 55 |
| CYCLORAMPHIDAE | <i>Crossodactylus</i> | <i>dispar</i> | - |
| | C. | sp. | - |
| | <i>Hylodes</i> | <i>sazimai</i> | - |
| | <i>Odontophrynus</i> | <i>americanus</i> | ?/55 |
| | <i>Proceratophrys</i> | <i>boiei</i> | - |
| HYLIDAE | <i>Bokermannohyla</i> | <i>luctuosa</i> | 55 |
| | <i>Dendropsophus</i> | <i>elongatus</i> | - |
| | D. | <i>minutus</i> | ?/27 |

| ORDEM | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADES |
| | D. | <i>nanus</i> | 30/55 |
| | D. | <i>sanborni</i> | ?/30/55 |
| | <i>Hypsiboas</i> | <i>albopunctatus</i> | ?/55 |
| | H. | <i>prasinus</i> | ? |
| | <i>Scinax</i> | <i>fuscumarginatus</i> | ?/3/55 |
| | S. | <i>fuscovarius</i> | - |
| | S. | <i>hiemalis</i> | 30 |
| | | | |
| LEPTODACTYLIDAE | <i>Leptodactylus</i> | <i>bokermanni</i> | - |
| | L. | <i>furnarius</i> | 3/55 |
| | L. | <i>fuscus</i> | ?/55 |
| | L. | <i>labyrinthicus</i> | ? |
| | L. | <i>ocellatus</i> | 55 |
| | L. | <i>sibilatrix</i> | ?/3 |
| | L. | <i>podicipinus</i> | - |
| | <i>Pseudopaludicola</i> | <i>saltica</i> | ?/55 |
| | P. | sp. | ?/55 |
| | <i>Physalaemus</i> | <i>cuvieri</i> | ?/55 |
| | | | |
| MICROHYLIDAE | <i>Elachistocleis</i> | <i>ovalis</i> | ?/55 |
| | E. | sp. | ? |

As interrogações correspondem a locais ainda indeterminados quanto à localização dentro ou fora dos limites da bacia.

| ORDEM | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADES |
| ORDEM TESTUDINES (TARTARUGAS) | | | |
| CHELIDAE | <i>Hydromedusa</i> | <i>tectifera</i> | 3/30 |
| ORDEM SQUAMATA (COBRAS-DE-DUAS-CABEÇAS) | | | |
| AMPHISBAENIDAE | <i>Amphisbaena</i> | <i>alba</i> | 30/55 |
| | <i>A.</i> | <i>dubia</i> | 10/55 |
| | <i>A.</i> | <i>mertensii</i> | 3/4/8/10/20/30/36/44/55 |
| | <i>A.</i> | <i>sp.</i> | - |
| | <i>Cercolophia</i> | <i>roberti</i> | 3/4/30/35/55 |
| | <i>Liotyphlops</i> | <i>ternetzi</i> | - |
| | <i>L.</i> | <i>sp</i> | - |
| ORDEM SQUAMATA (LAGARTOS) | | | |
| ANGUIDAE | <i>Ophiodes</i> | <i>fragilis</i> | 2/30 |
| | <i>O.</i> | <i>striatus</i> | 41 |
| GEKKONIDAE | <i>Hemidactylus</i> | <i>mabouia</i> | 55 |
| POLYCHRIDAE | <i>Polychrus</i> | <i>acutirostris</i> | - |
| ORDEM | | | |
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADES |
| | <i>Urostrophus</i> | <i>vautieri</i> | 30/55 |
| SCINCIDAE | <i>Mabuya</i> | <i>dorsivittata</i> | 29/30/40/55 |
| | <i>M.</i> | <i>frenata</i> | - |
| | <i>M.</i> | <i>sp.</i> | 55 |
| TEIIDAE | <i>Cercosaura</i> | <i>ocellata</i> | 55 |
| | <i>Kentropyx</i> | <i>paulensis</i> | 14 |
| | <i>Tupinambis</i> | <i>merianae</i> | 30/44/55 |
| TROPIDURIDAE | <i>Tropidurus</i> | <i>itambere</i> | 3/30 |
| | <i>T.</i> | <i>torquatus</i> | 3 |

| ORDEM | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADES |
| ORDEM SQUAMATA | | | |
| BOIDAE | <i>Boa</i> | <i>constrictor</i> | - |
| COLUBRIDAE | <i>Apostolepis</i> | <i>dimidiata</i> | 30 |
| | <i>Atractus</i> | sp. | 55 |
| | <i>Cercolophia</i> | <i>roberti</i> | 3/4/30/35/55 |
| | <i>Chironius</i> | <i>bicarinatus</i> | 30 |
| | <i>C.</i> | <i>quadricarinatus</i> | 23/55 |
| | <i>C.</i> | sp. | 55 |
| | <i>Clelia</i> | <i>occipitolutea</i> | - |
| | <i>Dipsas</i> | <i>indica</i> | 30/55 |
| | <i>Echinantera</i> | <i>undulatus</i> | - |
| | <i>Erythrolamprus</i> | <i>aesculapii</i> | 25/30/42 |
| | <i>Helicops</i> | <i>modestus</i> | 30/55 |
| | <i>Liophis</i> | <i>almadensis</i> | - |
| | <i>L.</i> | <i>miliaris</i> | 4/55 |
| | <i>L.</i> | <i>poecilogyrus</i> | 4/17/30/55 |
| | <i>L.</i> | <i>reginae</i> | 3/30/55 |
| | <i>L.</i> | <i>typhulus</i> | - |
| | <i>Mastigodryas</i> | <i>bifossatus</i> | 3/29/55 |
| | <i>Oxyrhopus</i> | <i>guibei</i> | 3/24/30/35/43/55 |
| | <i>Phalotris</i> | <i>mertensi</i> | 3/55 |
| | <i>Philodryas</i> | <i>olfersii</i> | 3/6/25/40/41/55 |
| | <i>P.</i> | <i>patagoniensis</i> | 26/40/55 |
| | <i>Sibynomorphus</i> | <i>mikanii</i> | 6/18/55 |
| | <i>Simophis</i> | <i>rhinostoma</i> | 3/4/5/30/55 |
| | <i>Tantilla</i> | <i>melanocephala</i> | 2/3/9/35/47/55 |
| | <i>Thamnodynastes</i> | <i>pallidus</i> | 30 |
| | <i>T.</i> | sp | 55 |
| | <i>T.</i> | <i>strigatus</i> | - |
| | <i>Waglerophis</i> | <i>merremii</i> | - |
| ELAPHIDAE | <i>Micrurus</i> | <i>corallinus</i> | 30/38 |
| | <i>M.</i> | <i>lemniscatus</i> | 4 |
| VIPERIDAE | <i>Bothrops</i> | <i>alternatus</i> | 55 |
| | <i>B.</i> | <i>jararaca</i> | 30/45/55 |
| | <i>Crotalus</i> | <i>durissus</i> | 1/16/19/55 |

| ORDEM | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| ORDEM TINAMIFORMES | | | |
| TINAMIDAE | <i>Crypturellus</i> | <i>obsoletus</i> | 30 |
| | <i>C.</i> | <i>parvirostris</i> | 38 |
| | <i>C.</i> | <i>tataupa</i> | 30/38 |
| | <i>Nothura</i> | <i>maculosa</i> | - |
| ORDEM PODICIPEDIFORMES | | | |
| PODICIPEDIDAE | <i>Tachybaptus</i> | <i>dominicus</i> | 55 |
| ORDEM PELECANIFORMES | | | |
| PHALACROCORACIDAE | <i>Phalacrocorax</i> | <i>brasilianus</i> | 55 |
| ORDEM CICONIIFORMES | | | |
| ARDEIDAE | <i>Butorides</i> | <i>striata</i> | - |
| | <i>Casmerodius</i> | <i>albus</i> ⁺ | 55 |
| | <i>Syrigma</i> | <i>sibilatrix</i> | 38 |
| ORDEM ANSERIFORMES | | | |
| ANATIDAE | <i>Aix</i> | <i>galericulata</i> ⁺ | - |
| | <i>Amazonetta</i> | <i>brasiliensis</i> | 7 |
| | <i>Anas</i> | <i>crecca</i> ⁺ | - |
| | <i>A..</i> | <i>flavirostris</i> | - |
| | <i>A..</i> | <i>platyrhynchos</i> ⁺ | - |
| | <i>Cygnus</i> | <i>melancoryphus</i> | - |
| | <i>Netta</i> | <i>rufina</i> ⁺ | - |
| ORDEM FALCONIFORMES | | | |
| ACCIPITRIDAE | <i>Buteo</i> | <i>brachyurus</i> | 30/38 |
| | <i>B.</i> | <i>magnirostris</i> | 30/55 |
| | <i>Elanus</i> | <i>leucurus</i> | 55 |
| | <i>Harpagus</i> | <i>diodon</i> | 30/55 |
| | <i>Heterospizias</i> | <i>meridionalis</i> | - |
| | <i>Ictinia</i> | <i>plumbea</i> | 3/30 |
| | <i>Rupornis</i> | <i>magnirostris</i> | 55 |
| FALCONIDAE | <i>Herpetotheres</i> | <i>cachinnans</i> | - |

| ORDEM | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| | <i>Falco</i> | <i>femoralis</i> | 3 |
| | <i>F.</i> | <i>sparverius</i> | 55 |
| ORDEM GALLIFORMES | | | |
| CRACIDAE | <i>Penelope</i> | <i>superciliaris</i> | 30 |
| ODONTOPHORIDAE | <i>Odontophorus</i> | <i>capueira</i> | - |
| | <i>Pavo</i> | sp. + | - |
| PHASIANIDAE | <i>Alectoris</i> | <i>chukar</i> ⁺ | - |
| | <i>Lophura</i> | <i>nycthemera</i> ⁺ | - |
| | <i>L.</i> | <i>swinhoci</i> ⁺ | - |
| ORDEM GRUIFORMES | | | |
| ARAMIDAE | <i>Aramus</i> | <i>guarauna</i> | 55 |
| RALLIDAE | <i>Aramides</i> | <i>cajanea</i> | 3/30/55 |
| | <i>Gallinula</i> | <i>chloropus</i> | 3 |
| | <i>Laterallus</i> | <i>leucopyrrhus</i> | 27 |
| | <i>L.</i> | <i>melanophaius</i> | 27 |
| | <i>Porphyrio</i> | <i>martinica</i> | 55 |
| | <i>Rallus</i> | <i>nigricans</i> ⁺ | - |
| ORDEM CHARADRIIFORMES | | | |
| CHARADRIIDAE | <i>Vanellus</i> | <i>chilensis</i> | 55 |
| JACANIDAE | <i>Jacana</i> | <i>jacana</i> | 55 |
| ORDEM COLUMBIFORMES | | | |
| COLUMBIDAE | <i>Columba</i> | <i>cayennensis</i> | 30/55 |
| | <i>C.</i> | <i>livia</i> | 55 |
| | <i>C.</i> | <i>picazuro</i> ⁺ | 3/44 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| | <i>Columbina</i> | <i>talpacoti</i> | 3/13/14/30/55 |
| | <i>Geopelia</i> | <i>cuneata</i> ⁺ | - |
| | <i>Geotrygon</i> | <i>violacea</i> | 30/55 |
| | <i>Leptotila</i> | <i>verreauxi</i> | 30/38/55 |
| | <i>L.</i> | <i>rufaxilla</i> | 30 |
| | <i>Scardafella</i> | <i>squammata</i> ⁺ | - |
| | <i>Zenaida</i> | <i>auriculata</i> | 3/13/55 |
| ORDEM PSITTACIFORMES | | | |
| PSITTACIDAE | <i>Agapornis</i> | <i>roseicollis</i> ⁺ | 55 |
| | <i>Amazona</i> | <i>aestiva</i> | - |
| | <i>A.</i> | <i>amazonica</i> | - |
| | <i>Ara</i> | <i>ararauna</i> | - |
| | <i>A.</i> | <i>chloropterus</i> | - |
| | <i>Aratinga</i> | <i>aurea</i> | - |
| | <i>A.</i> | <i>cactorum</i> | - |
| | <i>A.</i> | <i>leucophthalma</i> | - |
| | <i>Forpus</i> | <i>xanthopterygius</i> | 30/55 |
| | <i>Nandayus</i> | <i>nenday</i> | - |
| | <i>Pionus</i> | <i>maximiliani</i> | 30/55 |

| ORDEM | | | |
|------------------------|----------------------|---|-------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| ORDEM CUCULIFORMES | | | |
| CUCULIDAE | <i>Coccyzus</i> | <i>euleri</i> | 30 |
| | <i>Coccyzus</i> | <i>melacoryphus</i> | 30 |
| | <i>Crotophaga</i> | <i>ani</i> | 29/30/55 |
| | <i>Guira</i> | <i>guira</i> | 3/55 |
| | <i>Tapera</i> | <i>naevia</i> | 30/55 |
| ORDEM STRIGIFORMES | | | |
| STRIGIDAE | <i>Otus</i> | <i>atricapillus</i> | 30 |
| | <i>O.</i> | <i>choliba</i> ⁺ | 7/18/44/55 |
| | <i>Pulsatrix</i> | <i>koeniswaldiana</i> | 24 |
| | <i>P.</i> | <i>perspicillata</i> | - |
| | <i>Rhinoptynx</i> | <i>clamator</i> | 5 |
| | <i>Speotyto</i> | <i>cunicularia</i> ⁺ | 43/55 |
| | <i>S.</i> | <i>cunicularia grallaria</i> ⁺ | 27 |
| TYTONIDAE | <i>Tyto</i> | <i>alba</i> | 27/?/30 |
| ORDEM CAPRIMULGIFORMES | | | |
| CAPRIMULGIDAE | <i>Caprimulgus</i> | <i>parvulus</i> | 10/38/48 |
| | <i>Lurocalis</i> | <i>nattereri</i> ⁺ | 55 |
| | <i>L.</i> | <i>semitorquatus</i> | 30/55 |
| | <i>Nyctidromus</i> | <i>albicollis</i> | 10/30/38/55 |
| NYCTIBIIDAE | <i>Nyctibius</i> | <i>griseus</i> | 24/55 |
| ORDEM APODIFORMES | | | |
| APODIDAE | <i>Chaetura</i> | <i>andrei</i> ⁺ | 10/30/55 |
| | <i>Streptoprocne</i> | <i>zonaris</i> | 30 |
| TROCHILIDAE | <i>Amazilia</i> | <i>brevirostris</i> | 3 |
| | <i>A.</i> | <i>lactea</i> | 3/30/55 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| | <i>A.</i> | <i>versicolor</i> | 30 |
| | <i>Anthracothorax</i> | <i>nigricollis</i> | 30 |
| | <i>Calliphlox</i> | <i>amethystina</i> | 55 |
| | <i>Chlorostilbon</i> | <i>aureoventris</i> | 12/30/55 |
| | <i>Colibri</i> | <i>serrirostris</i> | - |
| | <i>Eupetomena</i> | <i>macroura</i> | 3/30/34/55 |
| | <i>Helimaster</i> | <i>squamosus</i> | - |
| | <i>Melanotrochilus</i> | <i>fuscus</i> ⁺ | 30 |
| | <i>Phaethornis</i> | <i>eurynome</i> | - |
| | <i>P.</i> | <i>pretrei</i> | 30/55 |
| | <i>Talurania</i> | <i>glaucopis</i> ⁺ | - |
| ORDEM CORACIIFORMES | | | |
| ALCEDINIDAE | <i>Chloroceryle</i> | <i>aenea</i> | 55 |
| | <i>Ceryle</i> | <i>torquatus</i> | 55 |
| ORDEM PICIFORMES | | | |
| PICIDAE | <i>Campephilus</i> | <i>robustus</i> | 30 |
| | <i>Celeus</i> | <i>flavescens</i> | 55 |
| | <i>Colaptes</i> | <i>campestris</i> | ?/55 |

| ORDEM | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| | <i>Dryocopus</i> | <i>lineatus</i> | 30/55 |
| | <i>Picumnus</i> | <i>cirrhatas</i> | 30/55 |
| | <i>Veniliornis</i> | <i>spilogaster</i> | 30/55 |
| RAMPHASTIDAE | <i>Ramphastos</i> | <i>toco</i> | 55 |
| ORDEM GAUBULIFORMES | | | |
| BUCCONIDAE | <i>Nystalus</i> | <i>chacuru</i> | 3 |
| ORDEM PASSERIFORMES | | | |
| CARDINALIDAE | <i>Cyanocompsa</i> | <i>cyanooides</i> | - |
| | <i>Saltator</i> | <i>similis</i> | 30/55 |
| COEREVIDAE | <i>Coereba</i> | <i>flaveola</i> | 3/30/55 |
| CONOPOPHAGIDAE | <i>Conopophaga</i> | <i>lineata</i> | 30/38/55 |
| CORVIDAE | <i>Cyanocorax</i> | <i>crisatellus</i> | 44 |
| COTINGIDAE | <i>Procnias</i> | <i>nudicollis</i> | - |
| DENDROCOLAPTIDAE | <i>Dendrocincla</i> | <i>turdina</i> | 30 |
| | <i>Dendrocolaptes</i> | <i>platyrostris</i> | 30 |
| | <i>Lepidocolaptes</i> | <i>fuscus</i> ⁺ | 30 |
| | <i>Sittasomus</i> | <i>griseicapillus</i> | 30 |
| EMBERIZIDAE | <i>Ammodramus</i> | <i>humeralis</i> | ? |
| | <i>Coryphospingus</i> | <i>cucullatus</i> | - |
| | <i>C.</i> | <i>pileatus</i> | - |
| | <i>Emberizoides</i> | <i>herbicola</i> | - |
| | <i>Haplospiza</i> | <i>unicolor</i> | 30 |
| | <i>Myospiza</i> | <i>humeralis</i> ⁺ | - |
| | <i>Paroaria</i> | <i>coronata</i> | - |
| | <i>Sicalis</i> | <i>flaveola</i> | 3 |

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
| | <i>Sporophila</i> | <i>albogularis</i> | - |
| | <i>S.</i> | <i>caerulescens</i> | 30 |
| | <i>S.</i> | <i>falcistrostris</i> | - |
| | <i>S.</i> | <i>lineola</i> | 15 |
| | <i>Tiaris</i> | <i>fuliginosus</i> | 30 |
| | <i>Volatinia</i> | <i>jacarina</i> | 3/9/30/55 |
| | <i>Zonotrichia</i> | <i>capensis</i> | 30/31/55 |
| | <i>Z.</i> | <i>leucophrys</i> | - |
| ESTRILDIDAE | <i>Chloebia</i> | <i>gouldiana</i> ⁺ | - |
| | <i>Estrilda</i> | <i>astriLd</i> | 3 |
| FRINGILLIDAE | <i>Carduelis</i> | <i>magellanica</i> | - |
| | <i>Euphonia</i> | <i>chlorotica</i> | 30/55 |
| | <i>E.</i> | <i>cyanoccephala</i> | - |
| | <i>E.</i> | <i>violacea</i> | 30 |
| FURNARIIDAE | <i>Automolus</i> | <i>leucophthalmus</i> | 30/55 |
| | <i>Cranioleuca</i> | <i>pallida</i> | 30 |
| | <i>Furnarius</i> | <i>rufus</i> | 55 |
| | <i>Synallaxis</i> | <i>frontalis</i> | 30/55 |
| | <i>S.</i> | <i>ruficapillus</i> | 30/55 |

| ORDEM | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| | | <i>S.</i> | <i>spixi</i> | 30/55 |
| | | <i>Xenops</i> | <i>rutilans</i> | 30 |
| HIRUNDINIDAE | | <i>Alopochelidon</i> | <i>fucata</i> | - |
| | | <i>Notiochelidon</i> | <i>cyanoleuca</i> ⁺ | 30/55 |
| | | <i>Progne</i> | <i>chalybea</i> | 30/55 |
| | | <i>P.</i> | <i>tapera</i> | ? |
| | | <i>Stelgidopteryx</i> | <i>ruficollis</i> | ? |
| | | <i>S.</i> | <i>rufipennis</i> | 30/55 |
| | | <i>Tachycineta</i> | <i>leucorrhoa</i> | ? |
| ICTERIDAE | | <i>Agelaius</i> | <i>ruficapillus</i> ⁺ | - |
| | | <i>Icterus</i> | <i>cayanensis</i> | 55 |
| | | <i>Leistes</i> | <i>superciliaris</i> ⁺ | ?/55 |
| | | <i>Molothrus</i> | <i>bonariensis</i> | ?/55 |
| | | <i>M.</i> | <i>rufoaxillaris</i> | - |
| | | <i>Pseudoleistes</i> | <i>guirahuro</i> | - |
| MIMIDAE | | <i>Mimus</i> | <i>saturninus</i> | - |
| MOTACILLIDAE | | <i>Anthus</i> | <i>lutescens</i> | 55 |
| PARULIDAE | | <i>Basileuterus</i> | <i>culicivorus</i> | - |
| | | <i>B.</i> | <i>flaveolus</i> | 30/55 |
| | | <i>B.</i> | <i>hypoleucus</i> | 30/55 |
| | | <i>B.</i> | <i>leucoblepharus</i> | 30 |
| | | <i>B.</i> | <i>leucophrys</i> | - |
| | | <i>B.</i> | <i>rivularis</i> ⁺ | - |
| | | <i>Geothlypis</i> | <i>aequinoctialis</i> | 55 |
| | | <i>Parula</i> | <i>pitiayumi</i> | 30/55 |
| PASSERIDAE | | <i>Passer</i> | <i>domesticus</i> | 10/32/55 |
| PIPRIDAE | | <i>Antilophia</i> | <i>galeata</i> | 30 |
| | | <i>Chiroxiphia</i> | <i>caudata</i> | 30/55 |
| | | <i>Manacus</i> | <i>manacus</i> | 30/38/55 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| THAMNOPHILIDAE | <i>Batara</i> | <i>cinerea</i> | 30 |
| | <i>Drymophila</i> | <i>ferruginea</i> | 30 |
| | <i>Dysithamnus</i> | <i>mentalis</i> | 30/55 |
| | Herpsilochmus | <i>ruimarginatus</i> | 30 |
| | Hypoedaleus | <i>guttatus</i> | 30 |
| | Mackenziaena | <i>severa</i> | 30 |
| | <i>Thamnophilus</i> | <i>caerulescens</i> | 30/55 |
| | <i>T.</i> | <i>doliatus</i> | 3/55 |
| | <i>T.</i> | <i>ruficapillus</i> | - |
| THRAUPIDAE | <i>Cissopis</i> | <i>leverianus</i> | - |
| | <i>Conirostrum</i> | <i>speciosum</i> | 30/55 |
| | <i>Cyanerpes</i> | <i>cyaneus</i> | 3 |
| | <i>Dacnis</i> | <i>cayana</i> | 30 |
| | <i>Habia</i> | <i>rubica</i> | 30/55 |
| | <i>Hemithraupis</i> | <i>ruficapilla</i> | 30 |
| | <i>Nemosia</i> | <i>pileata</i> | 30 |
| | <i>Pipraeidea</i> | <i>melanonota</i> | 30 |
| | <i>Ramphocelus</i> | <i>bresilius</i> | 55 |
| | <i>R.</i> | <i>carbo</i> | 55 |
| | <i>Tachyphonus</i> | <i>coronatus</i> | 30/38/55 |

| ORDEM | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | <i>Tangara</i> | <i>cayana</i> | 30/55 |
| | | <i>Tersina</i> | <i>viridis</i> | 13/55 |
| | | <i>Thlypopsis</i> | <i>sordida</i> | 30/55 |
| | | <i>Thraupis</i> | <i>cyanoptera</i> | - |
| | | <i>T.</i> | <i>ornata</i> | - |
| | | <i>T.</i> | <i>palmarum</i> | 55 |
| | | <i>T.</i> | <i>sayaca</i> | 3/?/14/30/50/55 |
| | | <i>Trichothraupis</i> | <i>melanops</i> | 30/55 |
| TITYRIDAE | | <i>Laniisoma</i> | <i>elegans</i> | - |
| | | <i>Pachyramphus</i> | <i>polychopterus</i> | 30 |
| | | <i>Schiffornis</i> | <i>virescens</i> | 30/55 |
| | | <i>Tityra</i> | <i>cayana</i> | - |
| TROGLODYTIDAE | | <i>Donacobius</i> | <i>atricapilla</i> | ? |
| | | <i>Troglodytes</i> | <i>aedon</i> ⁺ | - |
| TURDIDAE | | <i>Turdus</i> | <i>albicollis</i> | 30/55 |
| | | <i>T.</i> | <i>amaurochalinus</i> | 30/55 |
| | | <i>T.</i> | <i>fumigatus</i> | - |
| | | <i>T.</i> | <i>leucomelas</i> | 30/55 |
| | | <i>T.</i> | <i>rufiventris</i> | - |
| TYRANNIDAE | | <i>Arundinicola</i> | <i>leucocephala</i> | ?/55 |
| | | <i>Attila</i> | <i>rufus</i> | 55 |
| | | <i>Camptostoma</i> | <i>obsoletum</i> | 10/30/55 |
| | | <i>Capsiempis</i> | <i>flaveola</i> | 30/55 |
| | | <i>Cnemotriccus</i> | <i>fuscatus</i> | 30/55 |
| | | <i>Colonia</i> | <i>colonus</i> | 30/55 |
| | | <i>Contopus</i> | <i>cinereus</i> | ?/30/38/55 |
| | | <i>Corythopsis</i> | <i>delalandi</i> | 30/55 |
| | | <i>Elaenia</i> | <i>flavogaster</i> | 30/55 |
| | | <i>E.</i> | <i>parvirostris</i> | 55 |
| | | <i>E.</i> | <i>sp.</i> | 30/55 |
| | | <i>Empidonax</i> | <i>euleri</i> ⁺ | 30/55 |
| | | <i>Gubernetes</i> | <i>yetapa</i> | ? |
| | | <i>Hemitriccus</i> | <i>diops</i> | 30 |
| | | <i>Knipolegus</i> | <i>cyanirostris</i> | 30 |
| | | <i>Lepopogon</i> | <i>amaurocephalus</i> | 30/55 |
| | | <i>Machetornis</i> | <i>rixosa</i> | ? |
| | | <i>Megarhynchus</i> | <i>pitangua</i> | 30 |
| | | <i>Myiarchus</i> | <i>ferox</i> | 30/55 |
| | | <i>M.</i> | <i>swainsoni</i> | 30/55 |
| | | <i>Myiodynastes</i> | <i>maculatus</i> | 30/55 |
| | | <i>Myiopagis</i> | <i>caniceps</i> | 30 |
| | | <i>M.</i> | <i>viridicata</i> | 30 |
| | | <i>Myiophobus</i> | <i>fasciatus</i> | 30/55 |
| | | <i>Pitangus</i> | <i>sulphuratus</i> | 30/55 |
| | | <i>Platyrhynchus</i> | <i>mystaceus</i> | 7/30/50 |
| | | <i>Serpophaga</i> | <i>subcristata</i> | 30/55 |
| | | <i>Todirostrum</i> | <i>cinereum</i> | 30/?/55 |
| | | <i>Tolmomyias</i> | <i>sulphurescens</i> | 30/55 |
| | | <i>Tyrannus</i> | <i>melancholicus</i> | 14/30/55 |
| | | <i>T.</i> | <i>savana</i> | 55 |
| VIREONIDAE | | <i>Cyclarhis</i> | <i>gujanensis</i> | 30/55 |
| | | <i>Hylophilus</i> | <i>poicilotis</i> | 30/55 |

| ORDEM | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
|-------|---------|--------------|------------------|------------|
| | | <i>Vireo</i> | <i>olivaceus</i> | 30/55 |

ORDEM CATHARTIFORMES

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| CATHARTIDAE | <i>Coragyps</i> | <i>atractus</i> | 30/55 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|

* Espécies que aparecem em trabalhos ou no *splink* e nas coletas presentes no Museu de História Natural (UNICAMP), mas que não constam na lista do CEMAVE/IBAMA.
As interrogações correspondem a locais ainda indeterminados quanto à localização dentro ou fora dos limites da bacia.

| ORDEM | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
|-------|---------|--------|---------|------------|
|-------|---------|--------|---------|------------|

ORDEM DIDELPHIMORPHIA

| | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| DIDELPHIDAE | <i>Caluromys</i> | <i>philander</i> | 29 |
| | <i>Didelphis</i> | <i>albiventris</i> | 3/4/11/24/44/54/55 |
| | <i>D.</i> | <i>aurita</i> | - |
| | <i>D.</i> | <i>marsupialis</i> | 54 |
| | <i>Gracilinanus</i> | <i>microtarsus</i> | - |
| | <i>Lutreolina</i> | <i>crassicaudata</i> | 3/4/21/52/55 |
| | <i>Marmosa</i> | sp. | 24 |
| | <i>Monodelphis</i> | sp. | 30 |

ORDEM XENARTHRA (=EDENTATA)

| | | | |
|-------------|------------------|---------------------|----------|
| DASYPODIDAE | <i>Cabassous</i> | <i>unicinctus</i> | 30 |
| | <i>Dasyus</i> | <i>novemcinctus</i> | 29/44/52 |

ORDEM CHIROPTERA

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| MOLOSSIDAE | <i>Eumops</i> | <i>auripendulus</i> | 13 |
| | <i>E.</i> | sp. | 55 |
| | <i>Molossops</i> | <i>planirostris</i> | 55 |
| | <i>Molossus</i> | <i>molossus</i> | 14/30 |
| | <i>Tadarida</i> | <i>brasiliensis</i> | 14/53 |
| PHYLLOSTOMIDAE | <i>Anoura</i> | <i>caudifer</i> | 38 |
| | <i>A.</i> | <i>geoffroyi</i> | - |
| | <i>Artibeus</i> | <i>lituratus</i> | 29/30/32/38/55 |
| | <i>Carollia</i> | <i>perspicillata</i> | 29/38 |
| | <i>Chiroderma</i> | <i>dorie</i> | 29/38 |
| | <i>Desmodus</i> | <i>rotundus</i> | 30 |
| | <i>Glossophaga</i> | <i>soricina</i> | 38 |
| | <i>Micronycteris</i> | <i>megalotis</i> | 30 |
| | <i>Mimon</i> | <i>bennettii</i> | - |
| | <i>Phyllostomus</i> | <i>discolor</i> | 29/38 |

| ORDEM | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| | <i>P.</i> | <i>hastatus</i> | 30/38 |
| | <i>Platyrrhinus</i> | <i>lineatus</i> | 38 |
| | <i>Pygoderma</i> | <i>bilabiatum</i> | 38 |
| | <i>Sturnira</i> | <i>lilium</i> | 29/38 |
| | <i>Vampyressa</i> | <i>pusilla</i> | 38 |
| VESPERTILIONIDAE | <i>Histiotus</i> | <i>velatus</i> | 29 |
| | <i>Lasiurus</i> | <i>borealis</i> | 55 |
| | <i>L.</i> | <i>cinereus</i> | 30/55 |
| | <i>L.</i> | <i>sp.</i> | 55 |
| | <i>Myotis</i> | <i>nigricans</i> | 29 |
| | <i>Myotis</i> | <i>sp.</i> | - |
| ORDEM PRIMATES | | | |
| ATELIDAE | <i>Alouatta</i> | <i>guariba (ex – fusca)</i> | 30/38 |
| CALLITRICHIDAE | <i>Callithrix</i> | <i>jacchus</i> | - |
| CEBIDAE | <i>Cebus</i> | <i>apella</i> | 30/38 |
| | <i>C.</i> | <i>nigritus</i> | |
| PITHECIIDAE | <i>Callicebus</i> | <i>nigrifrons</i> | - |
| ORDEM CARNIVORA | | | |
| CANIDAE | <i>Cerdocyon</i> | <i>thous</i> | 22/28/48 |
| | <i>Chrysocyon</i> | <i>brachyurus</i> ⁺ | - |
| FELIDAE | <i>Herpailurus</i> | <i>yaguaroundi</i> | - |
| | <i>Leopardus</i> | <i>pardalis</i> ⁺ | - |
| | <i>L.</i> | <i>tigrinus</i> ⁺ | - |
| | <i>L.</i> | <i>wiedii</i> ⁺ | - |
| | <i>Puma</i> | <i>concolor</i> ⁺ | - |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| MUSTELIDAE | <i>Eira</i> | <i>barbara</i> | - |
| | <i>Galictis</i> | <i>cuja</i> | 24/45 |
| | <i>Lontra</i> | <i>longicaudis</i> | 23 |
| PROCYONIDAE | <i>Nasua</i> | <i>nasua</i> | - |
| | <i>Procyon</i> | <i>cancrivorus</i> | 54 |
| ORDEM ARTIODACTYLA | | | |
| CERVIDAE | Mazama | <i>americana</i> | - |
| | <i>M.</i> | <i>sp.</i> | 30 |
| ORDEM RODENTIA | | | |
| AGOUTIDAE | <i>Agouti</i> | <i>paca</i> | 30 |
| ERETHIZONTIDAE | Coendou | <i>sp.</i> | 30 |
| | <i>Sphiggurus</i> | <i>villosus</i> | 55 |
| HYDROCHAERIDAE | <i>Hydrochaeris</i> | <i>hydrochaeris</i> | 55 |
| MURIDAE | Akodon | <i>cursor</i> | 30 |
| | <i>A.</i> | <i>sp.</i> | 30 |
| ORDEM | | | |
| FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | LOCALIDADE |
| | <i>Bolomys</i> | <i>lasiurus</i> | 24 |
| | <i>Holochilus</i> | <i>brasiliensis</i> | 3 |
| | <i>Mus</i> | <i>musculus</i> | 55 |
| | <i>Nectomys</i> | <i>squamipes</i> | - |
| | <i>Oecomys</i> | <i>cf concolor</i> | - |
| | Oligoryzomys | <i>nigripes cf.</i> | - |
| | <i>Oryzomys</i> | <i>sp.</i> | 24 |
| | <i>Rattus</i> | <i>norvergicus</i> | - |
| | <i>R.</i> | <i>rattus</i> | 3/4/38/44/55 |
| | <i>Rhipidomys</i> | <i>mastacalis</i> | - |
| MYOCASTORIDAE | <i>Myocastor</i> | <i>coypus</i> | 55 |
| SCIURIDAE | Sciurus | <i>aestuans</i> | 30 |
| | <i>S.</i> | <i>sp.</i> | - |
| ORDEM LAGOMORPHA | | | |
| LEPORIDAE | <i>Sylvilagus</i> | <i>brasiliensis</i> | 24/29/30 |

† Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, presentes no Anexo à Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente.